

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по применению Винилина (Бальзама Шостаковского) для лечения ран различного происхождения,**  
**эндометритов и маститов у животных**  
**(организация-разработчик: ООО Фирма «БиоХимФарм», г. Радужный).**

**I. Общие сведения**

1. Наименование лекарственного препарата: Винилин (Vinilin), Бальзам Шостаковского. Международное непатентованное наименование: поливинил-бутиловый эфир.
2. Лекарственная форма: раствор для местного применения.  
Винилин в качестве действующего вещества содержит поливинокс (поливинил-бутиловый эфир).  
По внешнему виду препарат представляет собой густую вязкую жидкость светло-желтого цвета со специфическим запахом.  
Винилин выпускают расфасованным в аэрозольные баллоны по 100 и 170 г с распылительными головками и защитными колпачками, или расфасованным по 100 мл, 1 л и 10 л в тары полимерные соответствующей вместимости, укупоренных герметизирующими крышками с замком для контроля первого вскрытия.
3. Срок годности при соблюдении условий хранения – 5 лет со дня изготовления.  
Запрещается применение Винилина по истечении срока годности.
4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя при температуре от 5 °С до 25 °С.
5. Винилин следует хранить в местах, недоступных для детей.
6. Неиспользованный препарат с истекшим сроком годности утилизируют в соответствии с законодательством.

**II. Фармакологические свойства**

7. Винилин обладает противовоспалительным, антисептическим, анестезирующим действием. Способствует очищению ран, регенерации тканей и эпителизации.  
Препарат безвреден, не оказывает токсического действия на клетки и ткани организма. Действие его основано на способности изменять иммунобиологические свойства тканей, повышая их защитную реакцию.  
Лекарственный препарат по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76).

**III. Порядок применения**

8. Винилин применяют наружно для лечения ран различного происхождения (в том числе гнойных), ожогов, отморожений, трофических язв, воспалительных заболеваний кожи, дерматитов, маститов.
9. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к препарату.
10. Препарат применяют наружно, интрацестернально и внутриматочно. Перед применением подогревают до 39°С-40°С и интенсивно встряхивают.  
Для лечения ран, фурункулов, ожогов, осложненных раневых поверхностей препарат распыляют с расстояния 20-25 см в течение 3 секунд 1 раз в день с интервалом в 1-2 дня до выздоровления.  
Для лечения эндометритов препарат вводят в следующих дозах:  
- коровам и кобылам – по 50-55 г, что обеспечивается выпрыскиванием препарата из баллона в течение 28-32 секунд;  
- свиноматкам и овцематкам – по 25-30 г, для чего препарат выпрыскивается в течение 14-16 секунд.  
Перед внутриматочным введением Винилина проводят санитарную обработку наружных половых органов и корня хвоста. При необходимости освобождают полость матки от воспалительного экссудата.  
Для введения препарата на аэрозольный баллон надевают распылительную головку с катетером, захватывают шейку матки рукой, введенной через прямую кишку, осторожно вводят катетер через шейку в полость матки и, держа аэрозольный баллон вертикально, вводят содержимое баллона.  
Препарат вводят с интервалом в 48 часов 2-4 раза, в зависимости от тяжести течения болезни.  
Для лечения маститов перед применением Винилина содержимое большой четверти вымени выдаивают в отдельную посуду, сосок дезинфицируют 70%-ным спиртом.  
Для введения препарата снимают с клапанного устройства колпачок, надевают насадку и вводят в сосковый канал. Легкое нажатие на клапанное устройство в течение 2-3 секунд обеспечивает поступление в четверть вымени необходимой дозы препарата.  
Лактирующим коровам с клинической формой мастита Винилин вводят 2 раза в сутки с интервалом в 10-12 часов до выздоровления.  
При субклиническом мастите Винилин применяют 1 раз в день в течение 3-х суток.  
Сухостойным коровам, больным маститом, Винилин вводят трехкратно с интервалом между введениями 3-4 дня.
11. Симптомов передозировки при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не установлено.
12. Особенности действия препарата при начале применения или при его отмене не выявлено.

13. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата (обработки), так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной или нескольких доз применение препарата как можно раньше возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Винилина в соответствии с настоящей инструкцией не установлено.

15. Применение Винилина не исключает использования других лекарственных средств.

16. Молоко при наружном и внутриматочном применении препарата используют в пищу без ограничений. При лечении маститов молоко из здоровых четвертей вымени используют в пищу без ограничений, а из больных — после полного исчезновения клинических признаков мастита, подтвержденного маститными тестами.

Мясо убойных животных при применении препарата используется без ограничений.

#### **IV. Меры личной личной профилактики**

17. При работе с Винилином следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

18. При работе с лекарственным препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы с лекарственным препаратом следует вымыть руки с мылом. Запрещается использование пустой тары из-под лекарственного препарата для бытовых целей.

19. При попадании Винилина на кожу, ее следует протереть салфеткой, смоченной в растительном масле или другом нетоксичном органическом растворителе и промыть водой с мылом. Слизистые оболочки при попадании на них препарата необходимо промыть струей чистой воды. При необходимости следует обратиться к врачу (при себе иметь этикетку или инструкцию по применению препарата).